

MA2 - „písomná“ prednáška 22.4. 2020

Dvojny integral pries „oberejži“ oblast w \mathbb{C}^2 :

Budeme stále využívať integral v Riemannove „sústave“, t.j. jeho linie, poloh bude využívať kresčná, integrálne Riemannových súčetov - bude-li w \mathbb{C}^2 oberejži' množina na „obdĺžnik“ $w = \langle a, b \rangle \times \langle c, d \rangle$, tak i oberejži' oblast w „rozdeleniu“ na malej kousky“, v ktorých sa „rozdelenie“ approximáciu de' veličiny, ktorou chceme integralem upäť, používa myšľané (kontinuál) hodnoty funkcie v pôsobení „kousku“ w, tak opäť do toto rozdelenie pries všetky „kousky“ a budeme „lišiť“ pries zmenšoradu“ ktorých kouskov“ oblasti w. A sed' týkom toho neli upäť „matematiky“:


- 1) Je náležiť, že množina w máť byť rozdelená
(neomezenou oblast rozdeľme rozdelenie na kresčuť pries časťi s kresču „glochou“)
- 2) w by mala byť taká množina, aby bol gi "mohli" „rozdelenie“ na také časťi, ktoré glocha by sa dala sčítať - - v Riemannove súčetu byly sčítané ne trame $f(\xi_i, \eta_j) \Delta x_i \Delta y_j$, $(\xi_i, \eta_j) \in w_{ij}$ a $\Delta x_i, \Delta y_j$ byla „glocha“ obdĺžnika $w_{ij}\$ pri $w = \langle a, b \rangle \times \langle c, d \rangle$ - teda je potreba kresču vlastnosti funkcie, poslednej pre existenciu $\iint f(x, y) dx dy$, teda rovnatnosť poslednej na oblast w \mathbb{C}^2 (na vlastnosti w)
A mymu' sa priebeži (na uvoz, čo má „čka“, sa to nazad stavi)

(R) $\iint_{\bar{\omega}} f(x,y) dx dy$ hledáme definice pro množinu

$\bar{\omega}$ množina v R^2 a která ji nazýváme oblastí $\omega \subset R^2$
 (tj. $\bar{\omega} = \omega \cup \partial\omega$, $\partial\omega$ - hraniča ω), ω - omezená a
 funkce $f: \bar{\omega} \subset R^2 \rightarrow R$;

A je nazývá (R) $\iint_{\bar{\omega}} f(x,y) dx dy$ definice tablo:

(i) pokračujeme $\bar{\omega} \subset R^2$ ji omezená množina (někdejšia nazývaná "oblast"),
 exteriérové obdobou $\Omega \subset R^2$ tak, že $\bar{\omega} \subset \bar{\Omega}$; dle definice
 funkci $\tilde{f}(x,y)$ v Ω :



$$\tilde{f}(x,y) = \begin{cases} f(x,y), & (x,y) \in \bar{\omega} \\ 0, & (x,y) \in \Omega \setminus \bar{\omega} \end{cases}$$

A pak je definice $\iint_{\bar{\omega}} f(x,y) dx dy$ tablo:

Definice

Funkce f je R -integrálbarelná v $\bar{\omega}$ (přesné $f \in R(\bar{\omega})$),
 lzeže $\tilde{f} \in R(\Omega)$ a

$$\iint_{\bar{\omega}} f(x,y) dx dy = \iint_{\Omega} \tilde{f}(x,y) dx dy.$$

(Via skripta VŠCHT - doc. Turský a kol.: Matematika II)

Pozadavky k definici:

- 1) definice svolujejší s vodnější, když je počítatelná během všech desík Ω s hmotou $f(x,y)$ - jeřejíme, že tato počítatelnost je v oblasti $\bar{\omega}$ s hmotou $f(x,y)$ nebo - jde o jednu objektu „celku“ o rozloze $\bar{\omega}$ a „hmotě“ $f(x,y) \geq 0$ v $\bar{\omega}$ - počítatelnost celku a „hmotě“ Ω a „hmotě“ $f(x,y)$, jež ho jeřejíme „takto“.
- 2) Vypadá to, že definice $\iint_{\bar{\omega}} f(x,y) dx dy$ nám myslíla a daleko méně, než je v analogie "k integraci přes obdélník" - ale možná tomu tak:

je-li $\bar{\omega} = \langle a,b \rangle \times \langle c,d \rangle$, pak $\iint_{\bar{\omega}} f(x,y) dx dy$ existuje pro funkci f na $\bar{\omega}$, neboť f je na $\bar{\omega} \setminus K$, kde K je každou funkcií mnoha bodů a hmotností l. ar. jednoduchých oblastí (tedy uprostřed) a mimoře.

A ještě zanedbení funkce f pro $f \neq 0$ v Ω , tak pro spojitost f v Ω nestaci spojitost funkce f v maximu $\bar{\omega}$; f bude spojita v Ω , jež když máme $f|_{\partial\omega} = 0$! A to ještě nemusí (viz předešlý „príklady“ - během, objem) -

 - a odhad jsou „požadavky“ na oblast $\bar{\omega}$ - datí - požadavky na hranici $\partial\omega$ - a něco o existenci $\iint_{\bar{\omega}} f(x,y) dx dy$ plyne, že budeme chlít, aby $\partial\omega$ byla sloučna s hmotností počtu jednoduchých oblastí - viz daleko (a to už sloučené).

Dodatek k přednášce 20.2. (pro uživátek)

Definice jednoduchého obouku v \mathbb{R}^2 :

Jednoduchým oboukem \tilde{L} v \mathbb{R}^2 nazýváme množinu ($v \mathbb{R}^2$):

$\tilde{L} = \{ [x,y] \in \mathbb{R}^2; x = x(t), y = y(t); t \in \langle \alpha, \beta \rangle \}$, kde

$x(t), y(t) \in C^{(1)}(\langle \alpha, \beta \rangle)$ a platí:

$$\forall t_1, t_2 \in \langle \alpha, \beta \rangle : t_1 \neq t_2 \Rightarrow [x(t_1), y(t_1)] \neq [x(t_2), y(t_2)].$$

Tedy, \tilde{L} je obrazem jednorázové funkce, možné správně provést derivace (tj. levoška, která má v každém bodě levošku) a navíc, \tilde{L} je levoška, která sama sebe "reprezentuje", zahránuje si prostě v $\langle \alpha, \beta \rangle$.

Příklad: 1) graf funkce $y = f(x)$, $x \in \langle a, b \rangle$, $f \in C^{(1)}(a, b)$:

$$\tilde{L}_1 = \{ [x,y]; t \in \langle a, b \rangle, x = t, y = f(t) \}$$

$$(t, f(t))' = (1, f'(t)) \text{ v } \langle a, b \rangle \text{ a plní}$$

$$t_1 \neq t_2, t_1, t_2 \in \langle a, b \rangle \Rightarrow [t_1, f(t_1)] \neq [t_2, f(t_2)] \\ (\text{nebal } t_1 \neq t_2)$$

2) usekčka, dané body $A[a_1, a_2]$, $B[b_1, b_2]$:

$$\tilde{L}_2 : \begin{aligned} x &= a_1 + t(b_1 - a_1) \\ y &= a_2 + t(b_2 - a_2) \end{aligned}, t \in \langle 0, 1 \rangle$$

$$3) \tilde{L}_3 : \begin{aligned} x &= R \cos t \\ y &= R \sin t \end{aligned}, t \in \langle 0, \pi \rangle, R > 0$$

$$(R \cos t, R \sin t)' = (-R \sin t, R \cos t), t \in \langle 0, \pi \rangle$$

a dale - jako obvykle - evidence, vlastnosti; sýmekl $\iint_{\bar{\omega}} f(x,y) dx dy$
(a příklady na zadání)

1) Veta (evidence) $\bar{\omega}$ - omezená a usměrněná oblast v \mathbb{R}^2 :

a) podmínka nutná: (užlabr, slyška)

$$f \in R(\bar{\omega}) \Rightarrow f \text{ je omezená na } \bar{\omega}$$

b) podmínka postačující

(i) Je-li $f \in C(\bar{\omega})$, tj. f je spojite na $\bar{\omega}$, a

dále že jednoznačně korektně mnoha jednoduchých oblastí, pak $f \in R(\bar{\omega})$ (tj. existuje

$$\iint_{\bar{\omega}} f(x,y) dx dy).$$

(ii) Je-li $f \in C(\bar{\omega} \setminus K)$, kde $K \subset \bar{\omega}$, K je jednoznačně

korektně mnoha bodů a jednoduchých oblastí, a

f je omezená na $\bar{\omega}$, a $\bar{\omega}$ splňuje předpoklady v (i),
pak $f \in R(\bar{\omega})$.

Normativa (je příklad)

Nechť $\bar{\omega}$ splňuje předpoklady evidence a tedy, pak existuje

$$\mu(\bar{\omega}) = \iint_{\bar{\omega}} 1 dx dy - f(x,y)=1 \text{ v } \bar{\omega} \text{ je až jen spojite na } \bar{\omega} \\ (\text{j. korektně mnoha oblastí}) \text{ a omezená} \Rightarrow \\ \Rightarrow 1 \in R(\bar{\omega}) \text{ a takže je "vídět", že } \iint_{\bar{\omega}} 1 dx dy \\ \text{"je" velikost plochy } \bar{\omega}, \text{ tj. "obraz" } \bar{\omega} \\ - možná se mnoha "oblastí" \bar{\omega} a množství } \mu(\bar{\omega}) \\ \bar{\omega} - množství oblast$$

Obezreži: Je-li oblast $\bar{\omega} \subset R^2$ omezená a všechny-li $\iint_{\bar{\omega}} f(x,y) dx dy$,
 pak $\bar{\omega}$ se nazývá měřitelná oblast a $\iint_{\bar{\omega}} dx dy = \mu(\bar{\omega})$ je
 měra měřitelného $\bar{\omega}$.

(Tedy „měřitelná oblast $\bar{\omega}$ “ je důležité popsatu hranici $\partial\omega$ již měřitelnou.)
 Ve skutečnosti VŠCHT se nazývá „standardní oblast“)

2) Vlastnosti $\iint_{\bar{\omega}} f(x,y) dx dy$ (bude doloženo že je jednodušší zapsit
 $\iint_{\bar{\omega}} f$ - často se nazývá „nechodíz“ x, y, dx, dy)
 ($\bar{\omega}$ - měřitelná oblast)

Dostane se integral definovaný „slejze“ jako při integraci
 počtu obdélníku, vlastnosti „na“ analožné - platí

a) linearity:

$f, g \in R(\bar{\omega})$, $\alpha \in R$, pak $\alpha f \in R(\bar{\omega})$ i $f+g \in R(\bar{\omega})$ a platí:

$$\iint_{\bar{\omega}} \alpha f = \alpha \iint_{\bar{\omega}} f, \quad \iint_{\bar{\omega}} f+g = \iint_{\bar{\omega}} f + \iint_{\bar{\omega}} g;$$

b) aditivita

$\bar{\omega} = \bar{\omega}_1 \cup \bar{\omega}_2$, $\bar{\omega}_1, \bar{\omega}_2$ měřitelné oblasti, a nechť
 $\bar{\omega}_1 \cap \bar{\omega}_2 \subset \partial\omega_1 \cup \partial\omega_2$ (tj. $\bar{\omega}_1$ a $\bar{\omega}_2$ mají „společné“ jen
 hranici obory), pak $f \in R(\bar{\omega}_i)$, $i=1,2$ a platí

$$\iint_{\bar{\omega}} f = \iint_{\bar{\omega}_1} f + \iint_{\bar{\omega}_2} f;$$

- 7 -

c) uznádatu' a metu o šídu' hodnote:

(i) $\bar{\omega}$ - měřitka', $f \in R(\bar{\omega})$, $g \in R(\bar{\omega})$ a $f(x,y) \leq g(x,y)$ v $\bar{\omega}$,

$$\text{pak } \iint_{\bar{\omega}} f \leq \iint_{\bar{\omega}} g$$

(specielle - je-li $f \geq 0$ v $\bar{\omega}$, pak $\iint_{\bar{\omega}} f \geq 0$!)

(ii) $\bar{\omega}$ měřitka', a specielle $\alpha \leq f(x,y) \leq \beta$ v $\bar{\omega}$, pak

$$\alpha \mu(\bar{\omega}) \leq \iint_{\bar{\omega}} f \leq \beta \mu(\bar{\omega}) \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{R})$$

(můžeme $\iint_{\bar{\omega}} \alpha dx dy = \alpha \iint_{\bar{\omega}} dx dy = \alpha \mu(\bar{\omega})$)

(a stejně pro $\iint_{\bar{\omega}} \beta dx dy = \beta \mu(\bar{\omega})$)

(iii) a z (ii) plyne: je-li f spojita' na $\bar{\omega}$, pak existuje bod $(\xi, \eta) \in \bar{\omega}$ tak, že

$$(*) \quad f(\xi, \eta) = \frac{1}{\mu(\bar{\omega})} \iint_{\bar{\omega}} f(x,y) dx dy$$

($f(\xi, \eta)$ - šídu' hodnota veličiny f v $\bar{\omega}$)

Dk. (našanéme!):

(i) je-li f spojita' na $\bar{\omega}$ - měříme a uvažme', tj. lemeckou' množinu, pak f má v ní v $\bar{\omega}$ svých globálních extreム, tj.

(minf =) $m \leq f(x,y) \leq M (= \max f)$, $f \in R(\bar{\omega})$ a

a dle (ii): $m \mu(\bar{\omega}) \leq \iint_{\bar{\omega}} f(x,y) dx dy \leq M \mu(\bar{\omega})$, tj.

$$m \leq \frac{1}{\mu(\bar{\omega})} \iint_{\bar{\omega}} f(x,y) dx dy \leq M$$

a dalej si vzpomeneme na vlastnost malytratu' nezávislosti
grafu f funkce - "dokonalá" $\frac{1}{\mu(\bar{\omega})} \iint_{\bar{\omega}} f(x,y) dx dy \in \langle m, M \rangle,$

tedy si "malytratu'" v $\bar{\omega}$ - t.j. existuje $(\xi, \eta) \in \bar{\omega}$ tak, že $f(\xi, \eta)$.

3) Výřešení $\iint_{\bar{\omega}} f(x,y) dx dy$ - Fubiniho věta

"naší" pro speciální "druhy" oblastí $\bar{\omega}$ (a je to vlastně aplikace Fubiniho věty pro Ω a f)


a) standardní oblast 1. typu (také nazývaná oblast 1. typu)

$$\bar{\omega}_1 = \{ [x,y] \in \mathbb{R}^2; a \leq x \leq b; \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x) \}, \text{ kde}$$

$\varphi_1(x), \varphi_2(x)$ jsou funkce, definované na $[a, b]$,

a tedy $\varphi_i \in C([a, b])$, tak hranice $\bar{\omega}_1$ je spojovacím členem obvodu (na obouk) jednoduchých (snad ji nemusíme zde upřídit, ale skutečně si ho)

$\bar{\omega}$ je ledy nezávislá oblast současné s "dobrau" hranici, ledy nezávislá.
A pak Fubiniho věta říká: $\int f(x,y) dx dy = \int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y) dy \right) dx$



(počítání všechny vety)

Neset, vnitřního "integrálu" jíou $\varphi_1(x), \varphi_2(x)$ - a zahrát se ponejme 'x'!
To je "uvaž"

A píšemejší "anonym" Fubiniho věty:

Je-li $f \in C(\bar{\omega}_1)$, pak

$$(i) \text{ pro každé } x \in \langle a, b \rangle \text{ existuje } \int_a^b f(x, y) dy = \phi(x)$$

(ii) funkce $\phi(x)$ je integratelná v $\langle a, b \rangle$:

$\phi(x) \in R(\langle a, b \rangle)$ - závislý kde nejen vlastností funkce, ale i její integrace, tj. f , ale i jíže „dřív“ vhodné vlastnosti hranice $\bar{\omega}_1$, tj. vlastnosti funkcií $\varphi_1(x), \varphi_2(x)$ v $\langle a, b \rangle$.

Pak platí

$$\iint_{\bar{\omega}_1} f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \right) dx$$

(a těž dlež (i) a (ii) že ve vzdoru definice)

Vele (saxování) dokázat nebudeme, ale předchozé „vysvětlení“ si Fubiniho věta neslouží.


A další modifikace anonym Fubiniho věty (pro další „dřív“ $\bar{\omega}$)

b) standardní oblast 2. typu (měřitelná 2. typu)

$$\bar{\omega}_2 = \{ [x, y] \in \mathbb{R}^2; \varphi_1(y) \leq x \leq \varphi_2(y); c \leq y \leq d \}$$

$$\varphi_1(y), \varphi_2(y) \in C^1([c, d])$$

Je-li $f \in C(\bar{\omega}_2)$, pak $f \in R(\bar{\omega}_2)$, neboť $\bar{\omega}_2$ je opět oblast měřitelná - je rozsáhla a hranice $\partial\omega_2$ je opět soudružené dvojdílných oblastí.





A plateau:

$$(i) \text{ pro } \forall y \in [c, d] \text{ existeje} \\ \begin{aligned} & \psi_2(y) \\ & \int f(x, y) dx = \phi(y) \\ & \psi_1(y) \end{aligned}$$

$$a \quad \iint_{\bar{W}_2} f(x, y) dx dy = \int_c^d \left(\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx \right) dy$$

- c) \bar{w} může být například prvního nebo i druhého, pak lze si užít - může se integrovat dle a) nebo i dle b)
(ukázáme v příkladech - nejjednodušší příklad obdélník, kruh, elipsa, apod.)



a „nezávislý“ příklad - nezávislý parabolicka:


$$\text{r MA1 - obsah oblasti } \bar{W}_1 (\neq 0) - mymu' \mu(\bar{W}_1) = \int_a^b (\varphi_2(x) - \varphi_1(x)) dx;$$

$$\text{r MA2 - } \mu(\bar{W}_1) = \iint_{\bar{W}_1} dx dy = \int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} dy \right) dx = \int_a^b (\varphi_2(x) - \varphi_1(x)) dx = 0$$

Příklady:

① $\iint_{\bar{\omega}} (x^2 + y^2) dx dy$, kde $\bar{\omega} \subset \mathbb{R}^2$ je omezená oblast, ohraněná
pričlenami $x=0, y=0, x+y=2$;

take' ke zadání $\bar{\omega} = \{(x, y); x \in [0, 2], 0 \leq y \leq 2-x\}$
(takže treba ještě „jít nahoru“)



$$= \int_0^2 \left[x^2 y + \frac{y^3}{3} \right]_{y=0}^{y=2-x} dx = \int_0^2 \left(x^2(2-x) + \frac{(2-x)^3}{3} \right) dx = \dots$$

nebo i nějak v "oholeném paralelu" (zde bude „slejna“ dleky
souměrnosti v $\bar{\omega}$; f)

$$\iint_{\bar{\omega}} (x^2 + y^2) dx dy = \int_0^2 \left(\int_0^{2-y} (x^2 + y^2) dx \right) dy =$$


pro y píšeme
je $0 \leq x \leq 2-y$

$$= \int_0^2 \left[\frac{x^3}{3} + y^2 x \right]_{x=0}^{x=2-y} dy = \int_0^2 \left(\frac{(2-y)^3}{3} + y^2(2-y) \right) dy =$$

Jak si dát tento integrál interpretovat? - asi všechno

(i) objem leteckého trubice, které má vzdálenost v rovině $z=0$, kterou
jsou hrany tvořené $x=0, y=0, x+y=2$ a

„stěcha“ je placka - graf funkce $z = x^2 + y^2$ (rotacemi'
„uvalit“ se sh. 12) paraboloid)



(sakra' „klouzka“)


$$y = x^2 + y^2$$

$$x + y = 2$$


(ii) a fyzikálne by integrál mohlo poslat "nemot sekvenci"
nejjednodušší \bar{w} o hustote $\rho(x,y)=1$ (tj. homogenního)
vhledem k ose, jde o kosočtverec s pravěkem (tj. zeleným
a modrým)

$$\int = \iint_{\bar{w}} (x^2 + y^2) \rho(x,y) dx dy, \quad \rho(x,y) \equiv 1 \quad v \bar{w}$$

② (technicky') $\iint_{\bar{w}} \frac{x^2}{y^2} dx dy$, kde \bar{w} je oblast $\approx R^2$,
ohranicena grafy funkcií
 $y=x$, $y=\frac{1}{x}$ a průniku $x=2$.



Kdyžkum dleli integrálov v obecném pořadí, tak vidíme, že v něm hranici „novo“ funkce y – a tedyne tak můžeme užit additivu integrálu – algoritmu si to vykouzeli, co additivita „je“ – udělejme to:



$$I_y: \iint_{\bar{\omega}} \frac{x^2}{y^2} dx dy = \iint_{\omega_1} \frac{x^2}{y^2} dx dy + \iint_{\omega_2} \frac{x^2}{y^2} dx dy = F.V$$

„additivita“

$$\begin{aligned}
 &= \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(\int_{\frac{1}{y}}^2 \frac{x^2}{y^2} dx \right) dy + \int_1^2 \left(\int_1^y \frac{x^2}{y^2} dx \right) dy = \\
 &= \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{y^2} \left[\frac{x^3}{3} \right]_{\frac{1}{y}}^2 dy + \int_1^2 \frac{1}{y^2} \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^y dy = \\
 &= \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{y^2} \left(\frac{8}{3} - \frac{1}{3y^3} \right) dy + \int_1^2 \frac{1}{y^2} \left(\frac{8}{3} - \frac{y^3}{3} \right) dy = \dots
 \end{aligned}$$

- ③ Najdeť objem oblasti $\Omega \subset \mathbb{R}^3$, omezené, která je ohrazena
vodorovnou $z=0$, $x+y+z=2$ a plochou o rovnici $y=x^2$.

Jako aplikace dvouměřného integrálu jsou uvedeny naširok
pro výpočet objemu oblasti $\Omega \subset \mathbb{R}^3$, kde

$$\Omega = \{(x, y, z) ; (x, y) \in \omega, 0 \leq z \leq f(x, y)\},$$

kde ω - měřitelná oblast v \mathbb{R}^2 , $f \in C(\omega)$.

V tratu průseku je tedy nutno najít

$$1) f(x, y) \quad a \quad 2) \omega \subset \mathbb{R}^2$$

$$1) z=0 - je dáno, a rovnice x+y+z=2 \Rightarrow z=2-x-y$$


a Ω by měla být mezi $z=0$ a $z=2-x-y$, tj:

$$0 \leq z \leq 2-x-y \Rightarrow x+y \leq 2 \text{ nebo}$$

$$\underline{y \leq 2-x}$$

- Nutno ale v rovině oblast neomezená
(pod pevnou) - počítajíme jen ty místy
kde, že oblast Ω je omezena plochou
o rovnici $y=x^2$ - jak si může být
plocha (a obecně plochu o rovnici $y=f(x)$?)
představit? Zkusíme „vrtání“ -
pro $z=k$ je vrtání všechny $y=x^2$,
tj. plocha vzniká tak, že „ještě“
v pasekách $y=x^2$ podle osy z
obrácení směrem (nahoru, dolů)

- takže ploše se někdy
vratí plocha -
klasická vratí plocha "vznikne",
"přidáním" s hranicí $x^2+y^2=r^2$
na směru osy z .



a vrtání v rovině
 $z=0$, tj. $y=x^2$ nahoru
na ω usaví!

Jedý, $\omega = \{ [x,y] ; x \in [-2,1], x^2 \leq y \leq 2-x \}$


neboť průsečík paraboly $y=x^2$ a průměry $y=2-x$ snadno najdeme - musí platit, že průsečík mezi x-ovou osu a parabolou, po lehčerou je $x^2 = 2-x$, a tedy řešme kvadratickou rovnici $x^2 + x - 2 = 0 \Leftrightarrow x_1 = -2, x_2 = 1$.

Tedy: (*) $V(\Omega) = \iint_{\omega} (2-x-y) dx dy = \int_{F.V.}^1 \left(\int_{-2}^{x^2} (2-x-y) dy \right) dx =$

(užili jsme F.V. pro oblast ω 1. typu)

$$= \int_{-2}^1 \left[(2-x)y - \frac{y^2}{2} \right]_{y=x^2}^{y=2-x} dx = \int_{-2}^1 (2-x)^2 - \frac{(2-x)^2}{2} - \left[(2-x)x^2 - \frac{x^4}{2} \right] dx = \\ = \dots \text{ a.d. (dle „dohody“ nedopocítávám)}$$

A nyní se povede i „malého“ Ω



A zpravidla: integral (*)
ky se dal integral dle
Fubiniho vždy i „obraceně“
ale nejstejně, že vidíte, že
tato integrace bude „hádka“
a je se bude muset použít
additivita integrálu a
nauč, budou i „některé“
casy.

(pro $0 \leq y \leq 1$ lze $-\sqrt{y} \leq x \leq \sqrt{y}$)

- (4) Našme určit opel $V(\Omega)$, kde Ω je oblast, $\Omega \subset R^3$, kdeži ohrazená rovinou $z=0$ a plochami $z = 6 - y^2$ a $y = \frac{x^2}{2}$.


Našme (ži zde ohrazená rovinou $z=0$), že

$$V(\Omega) = \iint_{\omega} f(x,y) dx dy - a \text{ měříme "nejd" } f \text{ a } w:$$

(i) $f(x,y)$: asi $z = 4 - y^2$ (máme řešit x , i tak lze dležeme žádat funkci dvou proměnných, a graf - náleží - že opel „valcova“ plocha - \rightarrow že „parabola $z = 4 - y^2$ ve směru osy x (po každé x -pěti řeší „grafem“ stále parabola $z = 4 - y^2$) - tato plocha je žádaty „stopa“ kurelu, žilou základna řešit $z=0$

$$\underline{z=0 \text{ a } z=4-y^2 \text{ se pevnou pro } y^2=4, \text{ tj. } y=\pm 2}$$

$$\underline{z=0:}$$




a myslí se, „prida“ snadna! (žádám) valcova plocha $y = \frac{x^2}{2}$ - stopa v rovině $z=0$ je $y = \frac{x^2}{2}$ a $\frac{x^2}{2} = 2 \Leftrightarrow x = \pm 2$

\rightarrow a máme oblast ω !

$$\omega = \left\{ [x,y]; x \in (-2,2), \frac{x^2}{2} \leq y \leq 2 \right\}$$

A polus o malétek oblasti Ω



A výška $V(\Omega)$:

$$V(\Omega) = \iint_{\Omega} (4 - y^2) dx dy = F.V.$$

$$= \int_{-2}^2 \left(\int_{-\frac{x^2}{2}}^{2} (4 - y^2) dy \right) dx =$$

$$= \int_{-2}^2 \left[4y - \frac{y^3}{3} \right]_{-\frac{x^2}{2}}^{2} dx =$$

$$= \int_{-2}^2 \left[\left(8 - \frac{8}{3} \right) - \left(2x^2 - \frac{x^6}{24} \right) \right] dx = \dots$$

(množ. "uplo" $\frac{2 \cdot 128}{24} = V$)

Pravidla ke sčítání dvouzálohového integrálu (zájednodušení'
zápisu) budeme dáté pouze vrat:

Máme-li po vnitřku Fubiniho užív (např. pro Ω 1. typu)

$$\iint_{\Omega} f(x,y) dx dy = \int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y) dy \right) dx, \quad \text{pokud se často}$$

dvojíý integral nehrnuje

$$\int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y) dy - \text{americký}$$

se tak počít zálohou a zápis je

asi nejjednodušší - hude to lehce řešit dle pravid

(polohu by to někomu vadilo, pisto, jako dívce, ale snad shuknežímu
zápisu bude rovnouč)

A dnes již „prošedší“ příklad jako inspirace pro první část příštější prednášky - snad dnes už může do té mnohých „něčí“ ne přemýšlení:

$$\textcircled{5} \quad I = \iint_{\omega} (x^2 + y^2) dx dy, \text{ kde } \omega = \{ [x, y] ; x^2 + y^2 \leq R^2, R > 0 \}$$

(tj: integrací oboru již kruh o středu v $[0,0]$ a poloměru R)


interpretace: 1) obyčejná, složitější v rovině $z=0$;
 (naučme!) ohrazeného valcovou plátkovou $x^2 + y^2 = R^2$
 a shora rovnicí paraboloidem $z = x^2 + y^2$
 (takový „valcovej“ podstavec pod parabolického areádu)

2) hmotnost kruhové desky s tloušťkou z a tloušťkou $g(x,y) = x^2 + y^2$

3) moment sítrovnosti homogenní kruhové desky vzhledem ke středu kruhu

úloha: v kartézských souřadnicích:

$$I = \iint_{F.V.} dx \int_{-\sqrt{R^2-x^2}}^{\sqrt{R^2-x^2}} (x^2 + y^2) dy =$$



$$= \int_{-R}^R \left[x^2 y + \frac{y^3}{3} \right]_{-\sqrt{R^2-x^2}}^{\sqrt{R^2-x^2}} dx =$$


(dilky soudit
pravice)

$$= 4 \int_0^R \left(x^2 \sqrt{R^2-x^2} + \frac{(\sqrt{R^2-x^2})^3}{3} \right) dx = ?$$

- tato deska nenej „pekný“ integral - a jistěm užloha se nesla tak oblibená - proč?

Keherský " integral se nášlal asi proto, až jíme kruh popsalí" "površí" kartézských souřadnic - a byl s „kulatým“ oblastem“ nerozlišitelnou dohromady :

Když lzechnu ne fyzice počítati daný integral jako „kvadrát“ (tj. interpretaci 2), tak lzechnu ho, že nejsou integrál, ani rozdělení : - v kruhu může mít vzdálenost $r > 0$



$$dm(r) = r^2 \cdot 2\pi r dr \quad (\text{délka prstyňku} \times$$

$$\text{a pak } m = \int_0^R dm(r) = \int_0^R 2\pi r^3 dr = \frac{\pi r^4}{2} \quad \text{"říčka"}$$

- a tato fyzikální "úvaha" může být spolehlivou následkem -
- a dle jednoduchou cestou - co se za lehkou poskytne shryba? Volba jiných souřadnic a rovine -
- když jedna souřadnice je $r > 0$ (vzdálenost brdu koniny od foci), tak druhá "bude uhel φ - a jsou různých souřadnicích - a transformace kartézských souřadnic do polárních neumožňuje integrálu zácneme příslušnou přednášku.